

Roślina	Nazwa preparatu	Substancja aktywna	Zwalczane agrofagi	Dawka na 1 ha	Termin stosowania	
BOBIK	Boxer 800 EC/Tiara 800 EC	prosulfokarb 800 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,0-4,0 l	stosować do 5 dni po siewie	
	Corum 502,4 SL	bentazon 480 g + imazamoks 22,4 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	1,25 l	od fazy 2. liścia do fazy pięciu pędów bocznych	
	Wing P 462,5 EC	pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g	chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	4,0 l	bezpośrednio po siewie	
	Stallion 363 CS	chlomazon 30 g + pendimetalina 333 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,0 l	bezpośrednio po siewie	
	Agil-S 100 EC	propachizafop 100 g	chwasty jednoliścienne	0,5-1,5 l	po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną	
	Sekil 20 SP	acetamipryd 200 g	mszyca, strąkowiec bobowy, oprzędziki, wciornastki	0,2 kg	w momencie pojawienia się szkodnika, wg etykiety	
	Cimex One 500 EC	cypermetryna 500 g	mszyce, zmieniki	0,05 l	zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55)	
	Dobromir Top 250 SC*	azoksystrobina 250g	antraktoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)	0,8 l	środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość)(BBCH 17-72)	
PELUSZKA	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina 455 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,5 l	bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni	
	Boxer 800 EC/Tiara 800 EC	prosulfokarb 800 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,0-4,0 l	stosować do 5 dni po siewie	
	Cimex One 500 EC	cypermetryna 500 g	mszyce, zmieniki	0,05 l	zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).	
	Signum 33 WG	boskalid 26,7% + piraklostrobina 6,7%	askochytoza, plamistość liści	1,0 kg	askochytoza, plamistość liści	
ŁUBIN	Boxer 800 EC/Tiara 800 EC	prosulfokarb 800 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,0-4,0 l	stosować do 5 dni po siewie	
	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina 455 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	2,6 l	bezpośrednio po siewie	
	Wing P 462,5 EC	pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g	chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	4,0 l	bezpośrednio po siewie	
	Agil-S 100 EC	propachizafop 100 g	chwasty jednoliścienne	0,5-1,5 l	po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną	
	Sekil 20 SP	acetamipryd 200 g	mszyca, strąkowiec bobowy, oprzędziki, wciornastki	0,2 kg	w momencie pojawienia się szkodnika, wg etykiety	
	Cimex One 500 EC	cypermetryna 500 g	mszyce, zmieniki	0,05 l	zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55)	
		Switch 62,5 WG	cyprodynil 375 g + fludioksonil 250 g	szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza, zgorzelowa plamistość, mączniak prawdziwy	1 kg	stosować zapobiegawczo z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób na roślinach
	Signum 33 WG	boskalid 26,7% + piraklostrobina 6,7%	szara pleśń, rdza łubinu, askochytoza łubinu, brunatna plamistość liści łubinu	1 kg	środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się objawów choroby. Środek stosować od początku fazy kwitnienia do końca fazy wzrostu strąków (BBCH 60-80)	
GROCH NA NASIONA	Stallion 363 CS	chlomazon 30 g + pendimetalina 333 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,0 l	bezpośrednio po siewie	
	Corum 502,4 SL	bentazon 480 g + imazamoks 22,4 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	1,0-1,25 l	przy wysokości 6-12 cm – początek pojawiania się wąsów	
	Wing P 462,5 EC	pendimetalina 250 g + dimetenamid-P 212,5 g	chwasty dwuliścienne i jednoliścienne	4,0 l	bezpośrednio po siewie	
	Basagran 480 SL	bentazon 480 g	chwasty dwuliścienne	2,5-3,0 l	przy wysokości roślin 6-12 cm – początek pojawiania się wąsów czepnych	
	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina 455 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,5 l	bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni	
	Agil-S 100 EC	propachizafop 100 g	chwasty jednoliścienne	0,5-1,5 l	po wykształceniu 2-3 liści właściwych przez roślinę uprawną	
	Cimex One 500 EC	cypermetryna 500 g	mszyce, zmieniki	0,05 l	zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55)	
	Decis Mega 50 EW	deltametryna 50 g	strąkowiec grochowy, śmietka, wciornastek	0,15 l	od 1. liścia do końca rozwoju kwiatostanu	
	Sekil 20 SP	acetamipryd 200 g	strąkowiec grochowy, mszyca	0,2 kg	od fazy 1. liścia do końca kwitnienia	
		Switch 62,5 WG	cyprodynil 375 g + fludioksonil 250 g	mączniak prawdziwy, askochytoza, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	1,0 kg	po wystąpieniu pierwszych objawów
		Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina 250g	askochytoza, mączniak rzekomy	0,8 l	środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)
		Amistar 250 SC	azoksystrobina 250 g	Askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu	0,8 l	środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od początku rozwoju kwiatostanu do końca fazy kwitnienia (BBCH 51-69)
	Signum 33 WG	boskalid 26,7% + piraklostrobina 6,7%	askochytoza, plamistość liści	1,0 kg	askochytoza, plamistość liści	
SOJA	Boxer 800 EC/Tiara 800 EC	prosulfokarb 800 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	3,0-4,0 l	stosować do 3 dni po siewie	
	Pulsar 40	imazamoks 40 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	1,0 - 1,25 l	stosować po wchodach soi, od fazy gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na drugim węźle do fazy, gdy rozwinięty jest trójlistkowy liść na szóstym węźle (BBCH 12-16)	
	Stomp Aqua 455 CS	pendimetalina 455 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	1,5-2,6 l	bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 5 dni	
	Corum 502,4 SL	bentazon 480 g + imazamoks 22,4 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	1,0-1,25 l	przy wysokości 6-12 cm – początek pojawiania się wąsów	
	Dual Gold 960 EC	S-metolachlor	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	1,0-1,25 l	bezpośrednio po siewie do końca fazy kiełkowania	
	Plateen 41,5 WG	metrybuzyna 175 g + flufenacet 240 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	2,0 kg	stosować bezpośrednio po siewie	
	Sencor Liquid 600 SC	metrybuzyna 600 g	chwasty jednoliścienne i dwuliścienne	0,55 kg	bezpośrednio po siewie, najpóźniej do 3 dni	
	Cimex One 500 EC	cypermetryna 500 g	mszyce, zmieniki	0,05 l	zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55)	
	Sekil 20 SP	acetamipryd 200 g	strąkowiec grochowy, mszyca	0,2 kg	od fazy 1. liścia do końca kwitnienia	
		Dobromir Top 250 SC	azoksystrobina 250g	antraknoza, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rdza, askochytoza (zgorzelowa plamistość)	0,8 l	środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, od fazy rozwiniętego 7. liścia właściwego do fazy rozwoju strąków (20% strąków osiąga typową długość)(BBCH 17-72)
	Amistar Gold Max	azoksystrobina 125 g + difenokonazol 125 g	antraknoza, zgnilizna twardzikowa, chwościk purpurowy	1,0 l	po wystąpieniu pierwszych objawów	

Legenda:

- zwalczanie chwastów
- zwalczanie szkodników
- zwalczanie chorób

* plantacje nasienne

Przeznaczony do stosowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w etykiecie stosowania środka ochrony roślin.