

HERBICYD

IKANOS 



## Raj dla kukurydzy, piekło dla chwastów.

Preparat chwastobójczy do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (np. chwastnicy lub perzu) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Zabieg należy wykonać w fazie 2-8 liści kukurydzy w dawce 1,0-1,5 l/ha.

Pełne spektrum zwalczanych chwastów zarówno jedno-, jak i dwuliściennych zapewnia mieszanka:  
Ikanos 040 OD 1,0 l/ha + Zeagran 340 SE 1,5 l/ha,  
zastosowana w fazie 4-8 liści kukurydzy.



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Środek chwastobójczy w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

## Substancja aktywna

**nikosulfuron** (związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika)  
– 40 g w 1 litrze środka (4,36%).

## Działanie na chwasty

Ikanos 040 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój.

Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Środek najskuteczniej zwalcza chwastnicę jednostronną oraz inne chwasty prosowate w fazie od 3 liści do końca fazy krzewienia, natomiast roczne chwasty dwuliścienne w fazie 2-4 liści.

**Chwasty wrażliwe:** chwastnica jednostronna, wiechlina roczna, włośnica okółkowa, włośnica sina, włośnica zielona, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa wielonasienna, maruna bezwonna, rdest szczawiolistny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, bodziszek drobny, samosiewy rzepaku, jasnota purpurowa.

**Chwasty średnio wrażliwe:** perz właściwy, sorgo alpejskie.

**Chwasty odporne:** przetacznik perski, rdest ptasi, rdest powojowy, psianka czarna oraz chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

## Zakres stosowania i dawki

### • kukurydza:

Zalecana dawka jednorazowa: 1 l/ha.

Zabieg wykonać po wschodach w fazie 2-7 liści kukurydzy (BBCH 12-17).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

### Uwaga!

W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

### Nufarm Polska Sp. z o. o.

ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa

tel. +48 22 620-32-52

www.nufarm.pl

© 2016.01.15

## Chwasty wrażliwe



fiołek polny



gwiazdnica pospolita



tasznik pospolity



maruna bezwonna



bodziszek drobny



jasnota purpurowa



szarłat szorstki



tobołki polne

## Chwasty odporne



przetacznik perski



rdest ptasi



rdest powojowy

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwroc uwage na zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia oraz przestrzegaj sredkow bezpieczenstwa zamieszczonych w etykiecie.



Nufarm

Grow a better tomorrow.