

Mocarz[®]

Mocny na chwasty
w zbożach

- Niski koszt zabiegu na hektar
- Skuteczne zwalczanie chwastów dwuliściennych – w tym uciążliwych gatunków
- Ta sama niska dawka w zbożach i kukurydzy – tylko 0,2 kg/ha
- Nowoczesna formuła – granule łatwo rozpuszczalne w wodzie

 **BASF**
The Chemical Company



Zboża

Herbicyd Mocarz® 75 WG należy stosować wiosną:

zboża ozime: **Mocarz® 75 WG 0,2 kg/ha**

zboża jare: **Mocarz® 75 WG 0,2 kg/ha**

09 - 13

21

25

29

30

Zarejestrowany w owsie!

■ **w zbożach ozimych:**
od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia

■ **w zbożach jarych:**
od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia

■ **faza rozwojowa chwastów:** najlepiej 2 do 4 liści właściwych

Produkt skuteczny i bezpieczny w stosowaniu w łączonych zabiegach, np.:

- z regulatorami wzrostu (CCC)
- z nawozami dolistnymi (+RSM)
- z insektycydami (Fastac)
- z fungicydami (Duett Ultra, Duett Star, Corbel, Capalo, Opera Max)
- zarejestrowana mieszanka z Apyrosem*
- z innymi herbicydami np. IPU, MCPA

* Znak zastrzeżony firmy Monsanto



Kukurydza

Mocarz należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta, ponieważ podnosi on skuteczność zwalczanych chwastów.

chwasty dwuliścienne:

Mocarz® 75 WG + Olbras 88 EC*
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha

chwasty jedno- i dwuliścienne:

Mocarz® 75 WG + Olbras 88 EC*
0,2 kg/ha + 1,0 l/ha
+ herbicyd na chwasty jednoliścienne

00

05

11

12

13

14

15

34

* Olbras 88 EC – zastrzeżony znak handlowy firmy OBROL Kulczyński Sp.j.

Najważniejsze zalety:

- atrakcyjny koszt ochrony
- brak fitotoksyczności
- skutecznie zwalcza chwasty dwuliścienne
- najchętniej wybierany partner dla herbicydów zwalczających chwastnicę jednoliścienną

Mocarz®

Mocny na chwasty w kukurydzy



Produkty wymienione w publikacji powinny być stosowane zgodnie z etykietami rejestracyjnymi i tylko do zalecanych celów. Ponieważ producent nie ma wpływu na magazynowanie i stosowanie produktów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze sposobu magazynowania i stosowania tych produktów. Różne, szczególnie występujące miejscowo i regionalnie czynniki mogą wpływać na działanie produktów. Należą do nich np. czynniki pogodowe, stosunki glebowe, odmiany roślin uprawnych, zmianowanie, terminy zabiegów, stosowane dawki, mieszaniny z innymi produktami, występowanie odpornych organizmów (np. szczepy grzybów, roślin, owadów), technika stosowania itp. W wyniku szczególnie niekorzystnych warunków nie można wykluczyć zmian w skuteczności preparatów lub uszkodzeń roślin uprawnych. Za takie przypadki producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

 **BASF**
The Chemical Company

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.